


CEA MAI LUNGĂ PROTECȚIE COMBINATĂ

PENTRU CEI TREI PATOGENI



	DOI
<i>Erysipelas</i>	6 luni
<i>Parvovirus</i>	12 luni
<i>L. Pomona</i>	12 luni
<i>L. Canicola</i>	12 luni
<i>L. Icterohaemorrhagiae</i>	12 luni
<i>L. Australis</i>	6 luni
<i>L. Grippotyphosa</i>	12 luni
<i>L. Tarassovi</i>	12 luni

SIGURANȚA



PORCILIS® ERY + PARVO + LEPTO

UN VACCIN FOARTE SIGUR³

Studiul de siguranță 1

Datele studiului

- 14 scrofițe (16 săptămâni de viață).
Vaccinate cu 2 ml
de Porcilis® Ery + Parvo + Lepto în zona cefei.
- Necropsie efectuată 2 săptămâni mai târziu.

Rezultate*

Temperatura:

Nu s-au observat creșteri
ale temperaturii rectale sau
reacții sistemice asociate vaccinării.

Studiul de siguranță 2

Datele studiului

- 14 scrofițe (16 săptămâni de viață).
Vaccinate cu un vaccin PRRS și 4 ml (doua doze)
de Porcilis® Ery + Parvo + Lepto.
- Administrare concomitentă în zona gâtului.
 - Revaccinare cu o doză din fiecare vaccin 2 săptămâni mai târziu
 - Purceii au fost observați zilnic pentru reacțiile locale și sistemice pentru 14 zile după fiecare vaccinare. Temperatura rectală a fost măsurată în zilele 1, 2 și 3 înainte de fiecare vaccinare, imediat după vaccinare, 4 ore după vaccinare și apoi o dată pe zi timp de 4 zile după fiecare vaccinare.

* Siguranța produsului a fost studiată extensiv. Vă rugăm să urmăriți specificațiile complete privind reacțiile adverse așa cum sunt indicate în prospect, pe ultima pagină a broșurii.

Rezultate*

Efecte secundare/reacții locale:
În urma vaccinării nu au fost observate reacții post-vaccinale, cu excepția unei scrofițe (la 36) cu o mică reacție locală ce s-a putut observa timp de 5 zile după cea de a 3-a vaccinare.

